

DISSOLVUROL 0,25%

SOLUTION BUvable EN GOUTTES

Médicament autorisé n°303 243-7

COMPOSITION :

Bioxyde de Silicium ionisé (à l'état colloïdal) 0,25 g
Excipients : eau purifiée (ac. chlorhydrique, éthanol) q.s.p. 100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution buvable en gouttes, flacon de 45 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

OLIGOTHERAPIE (V : divers)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :

Laboratoire DISSOLVUROL

Stade Louis II - Entrée H

1, avenue des Castelans

98000 Monaco

Fabricant

H2 Pharma,

21 rue Jacques Tati, 78390 BOIS D'ARCY

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur de terrain en particulier au cours d'affections rhumatismales inflammatoires.

ATTENTION

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament *NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ* dans le cas suivant :

- antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVÉ A L'ADULTE

3 ml (60 gouttes) à 6 ml (120 gouttes) par jour en 2 prises à l'aide de la pipette doseuse, prélever dans le flacon la quantité nécessaire de solution.

Il est conseillé d'absorber la solution diluée dans un verre d'eau, en dehors des repas.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Il est conseillé d'absorber la solution diluée dans un verre d'eau, en dehors des repas. Agiter avant emploi.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

A prendre de préférence en dehors des repas.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS : quelques rares cas de légers troubles digestifs (maux d'estomac, nausées).

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Février 2009.

NODIDG1109