



# Dicynone® 500 mg

Etamsylate - Comprimé

## Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Etamsylate .....500 mg pour un comprimé  
Excipients: sulfite de sodium, acide stéarique, amidon de blé, cellulose microcristalline, povidone, dihydrogénéocitrate de sodium, q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé (Boîte de 20).

### Classe pharmaco-thérapeutique

AUTRE HEMOSTATIQUE SYSTEMIQUE

### Titulaire

Sanofi-aventis France  
1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

### Exploitant

Vifor France SA  
7-13, Bd paul Emile Victor - 92200 Neuilly sur Seine - France

### Fabricant

Sanofi Winthrop Industrie  
6, boulevard de l'Europe - 21800 Quétigny - France

261330

Sous licence de

 **OM Pharma**

OM Pharma SA  
Meyrin-Genève Suisse

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antihémorragique et un protecteur vasculaire.

Il est utilisé dans les troubles de la circulation veineuse liés à la fragilité des petits vaisseaux sanguins :

- les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, crampes),
- certains troubles visuels d'origine circulatoire,
- les saignements gynécologiques dus à la fragilité des vaisseaux sanguins.

## ATTENTION!

### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'intolérance ou d'allergie à l'étamsylate et/ou à l'un des autres composants.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten), notamment chez les personnes atteintes de maladie coeliaque.

Ce médicament est DECONSEILLE en cas d'allaitement.

### Mises en garde spéciales

Ce médicament contient des sulfites qui peuvent provoquer une réaction allergique généralisée (cf. Effets non souhaités et gênants).

En cas d'apparition d'une fièvre, le traitement doit être arrêté. Consultez immédiatement votre médecin.

### Précautions d'emploi

Si la gêne ne diminue pas en quinze jours, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si la gêne augmente, si la fragilité des vaisseaux (les bleus et les ecchymoses) s'étend, consultez immédiatement votre médecin.

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une hygiène de vie:

- Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

#### **Interactions médicamenteuses et autres interactions**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### **Grossesse - Allaitement**

Prévenir votre médecin en cas de grossesse.  
L'allaitement est déconseillé.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

#### **Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Amidon de blé (gluten) et sulfite de sodium.

#### **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

##### **Posologie**

En moyenne, 3 comprimés par jour.

##### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

261330

#### **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- possibilité de fièvre, maux de tête, éruptions cutanées, nausées, vomissements, diarrhée,
- en raison de la présence de sulfites, risque de réactions allergiques, allant de l'éruption cutanée à une réaction allergique généralisée parfois sévère et pouvant s'accompagner d'une gêne respiratoire.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

#### **CONSERVATION**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

#### **DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

Janvier 2009.

FR-DJ5/0911