

STIMOL®

MALATE DE CITRULLINE

STIMOL® 1g/10 ml, solution buvable en ampoule
Malate de citrulline

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

À VISÉE ANTI-ASTHÉNIQUE.

(A : Appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est préconisé dans les états de fatigue passagers.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS Á CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

Ne prenez jamais STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :

- allergie connue à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

- En cas de régime hyposodé, tenir compte dans la ration journalière de la présence de 30 mg de sodium par ampoule.

- En raison du pH acide, les ampoules doivent toujours être diluées dans un verre d'eau.

EN CAS DE DOUTE, N'HÉSITEZ PAS Á CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS Á VOTRE MÉDECIN OU Á VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse :

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS Á VOTRE MÉDECIN OU Á VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Excipient à effet notoire :

Sodium.

3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Adulte : 3 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée.

Enfant : 2 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée.

Diluer le contenu des ampoules dans un verre d'eau. Durée de traitement limitée à 4 semaines.

Mode d'administration :

Voie orale.

Durée du traitement :

NE PAS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES.

Si vous avez pris plus de STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû :

Un surdosage éventuel risque d'entraîner une aggravation des effets indésirables (troubles gastro-intestinaux).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Rares : légères brûlures d'estomac en début de traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule ?

La substance active est :

Malate de citrulline..... 1 g
Pour une ampoule de 10 ml.

Les autres composants sont :

Arôme naturel d'orange sangria, solution d'hydroxyde de sodium à 30 % (m/m), eau purifiée.

Qu'est-ce que STIMOL 1g/10 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 10 ml ; boîte de 18 ampoules.

Titulaire / Exploitant

BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

Fabricant

BIOCODEX

1 AVENUE BLAISE PASCAL

60000 BEAUVAIS

FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 novembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



BIOCODEX cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,

BIOCODEX participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.

BIOCODEX vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.